



Dora-ZOO®

Solución inyectable
Endoparasitocida y ectoparasitocida
para bovinos y porcinos
Reg. ICA 8035 DB



COMPOSICIÓN: Cada mL de Dora-ZOO® contiene:

Doramectina	10 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

INDICACIONES: En **bovinos, ovinos y porcinos** para el tratamiento de parasitismo interno y externo.

Bovinos

Endoparásitos

Parásitos gastrointestinales: *Haemonchous placei*, *Ostertagia ostertagi* (incluye formas inhibidas), *Trichostrongylus axei*, *Bunostomum phlebotomum*, *Nematodirus* sp., *Cooperia pectinata*, *Cooperia punctata*, *Trichostrongylus columbriformis*, *Oesophagostomum radiatum*, *Strongyloides papillosus*, *Trichuris* sp.

Parásitos pulmonares: *Dictyocaulus viviparus* (formas adultas y cuarto estadio larvario).

ECTOPARÁSITOS

Garrafas: Ayuda en el control de *Boophilus microplus*.

Nuches, larvas productoras: *Dermatobia hominis* e *Hipoderma bovis* (estadio parasitario).

Ácaros de la sarna: ayuda en el control de *Psoroptes communis* variedad bovis, *Chorioptes bovis* y *Sarcoptes scabiei* variedad bovis.

Piojos: Ayuda en el control *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus* y *Solenopotes capillatus*.

Laboratorios ZOO S.A.S.

Autopista Medellín, entrada parque la Florida Km 1, Bodega 10, Terrapuerto Industrial El Dorado. Cota
(Cund) - COLOMBIA. Teléfono 3504604567, (57) 601 8985482 www.laboratorioszoo.com



Miasis (gusaneras): *Dermatobia hominis*, *Hypoderma bovis* y *Cochliomyia hominivorax* (estadios parasitarios).
Ayuda en el control del piojo masticador *Damalinia bovis* y de la mosca de los cuernos *Haematobia irritans*.

OVINOS ENDOPARÁSITOS

Parásitos gastrointestinales: *Haemonchous contortus*, *Ostertagia circumcincta*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus columbriformis*, *Trichostrongylus vitrinus*, *Chabertia* sp., *Cooperia oncophora*, *Nematodirus* sp., *Trichuris* sp.

Parásitos pulmonares: *Dictyocaulus filaria*.

ECTOPARÁSITOS

Ácaros de la sarna: *Psoroptes ovis*.

Miasis (gusaneras): *Cochliomyia hominivorax* (estadios parasitarios).

Gusanos de la cabeza: *Oestrus ovis*.

PORCINOS ENDOPARÁSITOS

Parásitos gastrointestinales: *Hiostrongylus rubidus*, *Strongyloides ransomi*, *Ascaris suum*, *Oesophagostomum dentatum*, *trichuris suis*.

Parásitos pulmonares: *Stephanurus dentatus*.

ECTOPARÁSITOS

Ácaros de la sarna: *Sarcoptes scabiei* variedad *suis*.

DOSIS: En **bovinos** y **ovinos**, 1 mL por cada 50 kilogramos de peso (equivalente a 200 mcg por cada kg de peso).

En **porcinos**, 1 mL por cada 33 kilogramos de peso (equivalente a 300 mcg por cada kg de peso).

ADMINISTRACIÓN: Intramuscular o subcutánea.

PRECAUCIONES: No administrar por vía intravenosa.

TIEMPO DE RETIRO: Los **bovinos** y **ovinos** tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 35 días después de finalizado el tratamiento. Los **porcinos** tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 28 días después de finalizado el tratamiento. No administrar a vacas u ovejas en producción de leche para el consumo humano.
Consulte al Médico Veterinario.

PRESENTACIONES: Frascos por 50 mL, 500 mL, 1 Litro

Laboratorios ZOO S.A.S.

Autopista Medellín, entrada parque la Florida Km 1, Bodega 10, Terrapuerto Industrial El Dorado. Cota (Cund) - COLOMBIA. Teléfono 3504604567, (57) 601 8985482 www.laboratorioszoo.com