



Iver-ZOO® 3,5

Solución inyectable
Endoparasitocida y ectoparasitocida
para bovinos y porcinos
Reg. ICA 8064 DB



COMPOSICIÓN: Cada mL de Iver-ZOO® 3,5 contiene

Ivermectina 35 mg

Excipientes c.s.p. 1 mL

INDICACIONES: En **bovinos** para el tratamiento parasitismos internos (pulmonares y gastro intestinales) y externos (garrapatas, nuches, piojos y ácaros de la sarna).

ENDOPARÁSITOS

Parásitos gastrointestinales: *Haemonchous placei*, *Ostertagia ostertagi*, *Trichostrongylus axei*, *Bunostomum* sp., *Nematodirus* sp., *Cooperia punctata*, *Cooperia surnabada*, *Oesophagostomum radiatum*.

Parásitos pulmonares: *Dictyocaulus viviparus*.

Otros nematodos: *Parafilaria bovicola*, *Thelazia* sp.

ECTOPARÁSITOS

Nuches, larvas productoras: *Dermatobia hominis*.

Piojos chupadores: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus* y *Solenopotes capillatus*.

Piojos masticadores: Ayuda en el control de *Damalinea bovis*.

Ácaros de la sarna: *Psoroptes communis* variedad *bovis* y *variedad bovis*, *Chorioptes bovis*.

Miasis (gusaneras): *Cochliomyia hominivorax*.

Garrapatas: *Boophilus microplus*.

Coadyuva en el control de la reinfestación de *Haemonchous placei*, *Trichostrongylus axei*, *Cooperia* sp., *Ostertagia ostertagi* y *Oesophagostomum radiatum* por 49 días; *Dictyocaulus viviparus* por 63 días; *Boophilus microplus* por 75 días; *Psoroptes communis* variedad *bovis* por 56 días y *Dermatobia hominis* por 140 días.

DOSIS: 1 mL por cada 175 kilogramos de peso (equivalente a 200 mcg por cada kg de peso).

ADMINISTRACIÓN: Subcutánea, estrictamente en la parte anterior o posterior de la región escapular (o la paleta).

Laboratorios ZOO S.A.S.

Autopista Medellín, entrada parque la Florida Km 1, Bodega 10, Terrapuerto Industrial El Dorado. Cota (Cund) - COLOMBIA. Teléfono 3504604567, (57) 601 8985482 www.laboratorioszoo.com



PRECAUCIONES: No administrar por vía intravenosa, ni por vía intramuscular.

TIEMPO DE RETIRO: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 122 días después de finalizado el tratamiento. No administrar a vacas en producción de leche para el consumo humano, ni 122 días antes del parto.
Consulte al Médico Veterinario.

PRESENTACIONES: Frascos por 50 mL, 500 mL.

Laboratorios ZOO S.A.S.

Autopista Medellín, entrada parque la Florida Km 1, Bodega 10, Terrapuerto Industrial El Dorado. Cota
(Cund) - COLOMBIA. Teléfono 3504604567, (57) 601 8985482 www.laboratorioszoo.com