



Melox-ZOO® 2%

Solución inyectable
**Analgésico, antiinflamatorio,
antipirético**
Reg. ICA 7966-MV



DESCRIPCIÓN: Antiinflamatorio del grupo AINE, inhibidor de las ciclooxigenasas con acción selectiva de 90% sobre COX-2, con mínimos efectos adversos sobre tejidos altamente sensibles a los demás antiinflamatorios.

COMPOSICIÓN: Cada mL de Melox-ZOO® 2% contiene
Meloxicam.....20 mg
Excipientes c.s.p.....1 mL

INDICACIONES: En **bovinos, equinos y porcinos** como analgésico y antiinflamatorio en trastornos músculo-esqueléticos agudos y crónicos.
Reduce la inflamación y dolor antes y después de cirugías ortopédicas y de tejidos blandos.

CONTRAINDICACIONES: Evitar el uso del producto en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos, debido a que se aumenta el riesgo de toxicidad renal. No administrar al mismo tiempo con glucocorticoides ni con otros antiinflamatorios no esteroideos. No utilizar en animales gestantes, bovinos y equinos menores de 6 meses de edad. No utilizar en animales con deficiencia hepática, cardíaca o renal o con alteraciones hemorrágicas o gastrointestinales.

EFFECTOS SECUNDARIOS: En algunos casos puede haber tumefacción ligera y transitoria en el sitio de inyección.

DOSIS:

Equinos: Aplicar 3 mL por cada 100 kg de peso (equivalente a 0,6 mg/kg de peso).
Se puede aplicar otra dosis después de 24 horas.

Laboratorios ZOO S.A.S.

Autopista Medellín, entrada parque la Florida Km 1, Bodega 10, Terrapuerto Industrial El Dorado. Cota
(Cund) - COLOMBIA. Teléfono 3504604567, (57) 601 8985482

www.laboratorioszoo.com



Bovinos: aplicar 2.5 mL por cada 100 kg de peso (equivalente a 0,5 mg/kg de peso).
El tratamiento puede repetirse cada 24 horas durante 3 a 5 días.

Porcinos: aplicar 2 mL por cada 100 kg de peso (equivalente a 0,4 mg/kg de peso).
Se puede aplicar otra dosis después de 24 horas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Equinos: Vía intravenosa.

Bovinos: Vía subcutánea o intravenosa.

Porcinos: Vía intramuscular. Dosis de Melox-ZOO® 2% según especie y peso.

Especie	Peso animal	Dosis práctica de Melox-ZOO® 2%	Vía de administración
Equina	100 kg	3 mL	IV
	200 kg	6 mL	IV
	300 kg	9 mL	IV
Bovina	100 kg	2.5 mL	IV o SC
	200 kg	5 mL	IV o SC
	300 kg	7,5 mL	IV o SC
	400 kg	10 mL	IV o SC
	500 kg	12,5 mL	IV o SC
	600 kg	15 mL	IV o SC
Porcina	100 kg	2 mL	IM
	200 kg	4 mL	IM
	300 kg	6 mL	IM

PRECAUCIONES: En caso de producir efectos secundarios suspender el tratamiento y consultar al Médico Veterinario. La seguridad de su uso en animales en gestación o lactancia no ha sido establecida, por lo tanto, su aplicación queda a criterio del Médico Veterinario.

INTERACCIONES: Aspirina y corticosteroides: Puede aumentar el riesgo de toxicidad gastrointestinal (por ejemplo, ulceración, sangrado, vómitos, diarrea). Medicamentos nefrotóxicos (furosemda, aminoglucósidos, anfotericina b, etc.): Puede aumentar el riesgo de nefrotoxicidad.

TIEMPO DE RETIRO: Los bovinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 15 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 5 días después de finalizado el mismo, no debe destinarse para consumo humano. Los porcinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 5 días después de finalizado el tratamiento.

PRESENTACIONES: Frascos viales por 10 mL, 50 mL.

Laboratorios ZOO S.A.S.

Autopista Medellín, entrada parque la Florida Km 1, Bodega 10, Terrapuerto Industrial El Dorado. Cota
(Cund) - COLOMBIA. Teléfono 3504604567, (57) 601 8985482

www.laboratorioszoo.com