



Vermiplex[®] N.F.

Tabletas

Antiparasitario interno de
amplio espectro para perros

Reg. ICA 6791-MV



Vermiplex[®] N.F.

Febantel
Praziquantel
Pamoato de Pirantel

Tabletas



Antiparasitario interno
de amplio espectro
para perros y gatos

DESCRIPCIÓN: Antiparasitario interno para el control de nematodos y cestodos en **perros y gatos**. El mecanismo de acción del febantel, es la inhibición de la enzima fumarato reductasa en el parásito, por consiguiente, bloquea la absorción de glucosa. La mayor actividad se debe a los metabolitos activos derivados: Fenbendazol y oxfendazol. El pirantel actúa como un agente bloqueador neuromuscular despolarizante en los parásitos susceptibles, por lo tanto, paraliza al parásito. Tiene propiedades parecidas a la nicotina y actúa similarmente como acetilcolina, inhibiendo la colinesterasa. El mecanismo de acción del praziquantel contra cestodos no ha sido determinado. A bajas concentraciones *in vitro*, deteriora los ganchos succionadores y estimula la movilidad del parásito. A altas concentraciones *in vitro*, incrementa la contracción del estróbilo del parásito (cadena de proglótides). Además, provoca vacuolización focal irreversible con consecuente desintegración en sitios específicos del tegumento del cestodo. En esquistosomas y tremátodos, el praziquantel elimina directamente el parásito, posiblemente por el incremento del flujo de iones calcio en el parásito. La vacuolización focal del tegumento del parásito permite que el parásito sea fagocitado.

COMPOSICIÓN:

Cada tableta contiene

Febantel	300 mg
Praziquantel	60 mg
Pamoato de Pirantel	60 mg
(Pirantel base 20,8 mg)	
Excipientes c.s.p.....	1 tableta

INDICACIONES: En perros y gatos de todas las razas para el tratamiento del parasitismo gastrointestinal causado por cestodos, nemátodos y protozoarios.

Laboratorios ZOO S.A.S.

Autopista Medellín, entrada parque la Florida Km 1, Bodega 10, Terrapuerto Industrial El Dorado.

Cota (Cund) - COLOMBIA. Teléfono 3504604567, (57) 601 8985482 www.laboratorioszoo.com



Nematodos: *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxocara leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*.

Cestodos: *Dipylidium caninum*, *Taenia multiceps*, *Taenia hydatigena*, *Taenia pisiformis*, *Equinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*.

Protozoarios: *Giardia sp.*

DOSIS: Administrar vía oral una tableta de Vermiplex N.F., por cada 10 kg de peso. (Febantel 300 mg por cada 10 kg de peso, 60 mg de Prazicuantel por cada 10 kg de peso y Pamoato de pirantel 60 mg por cada 10 kg de peso. Repetir la dosis a los 15 y 21 días o según el criterio del Médico Veterinario.

En el tratamiento contra protozoarios (*Giardia sp.*) se recomienda administrar la misma dosis durante 3 días seguidos. Las tabletas pueden ser administradas directamente en la boca o con una cantidad pequeña de alimento.

DOSIS: Una tableta de Vermiplex® N.F. 10 por cada 10 kg de peso, repetir la dosis al día siguiente y repetir el tratamiento a los 15 - 21 días o según el criterio del Médico Veterinario.

Se puede dosificar según la siguiente tabla.

Vermiplex N.F.	1/2 tableta	1 tableta	2 tabletas	3 tabletas	4 tabletas
Peso del animal	5 - 10 kg	10 - 20 kg	20 - 30 kg	30 - 40 kg	más de 40 kg

En el tratamiento contra protozoarios (*Giardia sp.*) se recomienda administrar la misma dosis durante 3 días seguidos.

ADMINISTRACIÓN: Oral. Las tabletas pueden ser administradas directamente en la boca o con una cantidad pequeña de alimento.

Consulte al Médico Veterinario.

PRECAUCIONES: Se aconseja repetir el tratamiento periódicamente, según la prevalencia de los parásitos internos y la presencia de pulgas que actúan como huéspedes intermediarios de cestodos, las cuales el animal ingiere al rascarse.

CONTRAINDICACIONES: No administrar el producto a hembras gestantes, perros menores de 4 semanas de edad o menor de 1 kg de peso y gatos menores de 6 semanas de edad.

INTERACCIONES: Ninguna reportada para el Febantel. Para Pamoato de Pirantel, debido a los mecanismos de acción similares y toxicidad. Al administrar con el alimento se aumenta la absorción del prazicuantel. Para pirantel, debido a los mecanismos de acción similares y toxicidad, no se recomienda el uso concomitante con levamisol y morantel. No usar simultáneamente con organofosforados y dietilcarbamazina. El pirantel y la piperazina tienen mecanismos antagonistas, no usar conjuntamente.

PRESENTACIONES: Caja por un sobre de 4 tabletas.

Laboratorios ZOO S.A.S.

Autopista Medellín, entrada parque la Florida Km 1, Bodega 10, Terrapuerto Industrial El Dorado.

Cota (Cund) - COLOMBIA. Teléfono 3504604567, (57) 601 8985482 www.laboratorioszoo.com