



ZOO-Diar® N.F.

Suspensión oral
Antidiarreico y rehidratante
Reg. ICA 3738-DB



DESCRIPCIÓN

Es la combinación de dos principios activos antibacterianos, de la familia de las sulfamidas: La sulfaguanidina y el ftalilsulfatiazol. Estas dos sulfonamidas son muy efectivas en el tratamiento de las infecciones gastrointestinales por inhibición competitiva con el PABA (ácido para-aminobenzóico) impidiendo la síntesis de ácido fólico, esencial para el crecimiento y la reproducción bacteriana. Su reducida absorción (prolongada permanencia en el intestino) y su acción antibacteriana selectiva (conservación de la flora normal del intestino), favorecen la rápida recuperación de los animales. Zoo-Diar® N.F. contiene caolín (silicato de aluminio hidratado natural) y pectina cítrica (ácido poligalacturónico natural), compuestos no absorbibles que tapizan el epitelio intestinal, evitando la irritación, erosión y descamación provocadas por los agentes tóxicos o infecciosos. Estas sustancias capturan físicamente las toxinas del metabolismo bacteriano, facilitando su eliminación a través de la materia fecal.

Proporciona electrolitos: Citrato de sodio, cloruro de sodio y cloruro de potasio, compuestos vitales para el mantenimiento del equilibrio hídrico y electrolítico afectado por la deshidratación, consecuencia de los procesos diarreicos.

La homatropina metil bromuro presente en ZOO-Diar® N.F., actúa como antiespasmódico y anticolinérgico de acción inmediata, disminuye la hipermotilidad y la hipersecreción intestinal, para el control del cólico y la diarrea.

COMPOSICIÓN: Cada 10 g contienen

F-talilsulfatiazol	3,5 g
Sulfaguanidina	3,5 g
Pectina cítrica	0,2 g
Caolín coloidal	2,3 g
Cloruro de sodio	0,161 g
Cloruro de potasio	0,051 g
Homatropina metil bromuro	3,0 mg
Excipientes c.s.p.	10 mg

Laboratorios ZOO S.A.S.

Autopista Medellín, entrada parque la Florida Km 1, Bodega 10, Terrapuerto Industrial El Dorado. Cota (Cund) - COLOMBIA. Teléfono 3504604567, (57) 601 8985482 www.laboratorioszoo.com



INDICACIONES: Tratamiento de las diarreas infecciosas, causadas por bacterias gram-positivas y gram-negativas, tales como: *Escherichia coli* enterotoxigenica, *Klebsiella* sp., *Streptococcus* sp., *Proteus* sp. y *Shigella* sp. Es útil en el tratamiento de las diarreas causadas por coccidias, diarreas del recién nacido, fermentaciones bacterianas anormales y gastroenteritis de diversa etiología.

DOSIS: 70 - 200 mg por kg de peso vivo, vía oral, cada 6 - 12 horas durante 3-5 días seguidos, o según el criterio del Médico Veterinario.

En la práctica: Un sobre por 50 kg de peso vivo disuelto en un litro de agua o en el agua de bebida y administrar en balde, con sonda o con botella.

Dosificar según la siguiente tabla

Peso del animal	Antibacteriano	Antiprotozoario	Peso del animal	Antibacteriano	Antiprotozoario
0,5 kg	0,5 mL	0,7 – 1,5 mL	30 kg	30 mL	42,9 – 85,7 mL
1 kg	1 mL	1,5 – 3 mL	40 kg	40 mL	57,1 – 114,3 mL
2 kg	2 mL	3,0 – 5,7 mL	50 kg	50 mL	71,4 – 142,9 mL
3 kg	3 mL	4,3 – 6,0 mL	60 kg	60 mL	85,7 – 171,4 mL
4 kg	4 mL	5,7 – 11,4 mL	70 kg	70 mL	100 mL – 200 mL
5 kg	5 mL	7,1 – 14,3 mL	80 kg	80 mL	114,3 mL – 228,6 mL
10 kg	10 mL	14,3 – 28,6 mL	90 kg	90 mL	128,6 – 257,1 mL
20 kg	20 mL	28,6 mL – 57,1 mL	100 kg	100 mL	142,9 – 285,7 mL

ADMINISTRACIÓN: Oral, disuelto en agua o en el agua de bebida.

TIEMPO DE RETIRO: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 5 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 60 horas después de finalizado el mismo, no debe darse al consumo humano.

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

PRESENTACIÓN: Caja de 10 sobres por 10 g cada uno.

Laboratorios ZOO S.A.S.

Autopista Medellín, entrada parque la Florida Km 1, Bodega 10, Terrapuerto Industrial El Dorado. Cota (Cund) - COLOMBIA. Teléfono 3504604567, (57) 601 8985482 www.laboratorioszoo.com