



ZOO-Floxín®

Tabletas
Antibiótico oral de amplio
espectro para perros y gatos
Reg. ICA: 5787 DB



DESCRIPCIÓN: La ciprofloxacina actúa mediante la inhibición de la DNA-Girasa bacterial, por consiguiente previene la síntesis y el desdoblamiento del DNA. Tiene una muy buena actividad antimicrobiana y contra bacilos y cocos gramnegativos, incluyendo la mayoría de cepas y especies de *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella* sp., *E. coli*, *Enterobacter*, *Campylobacter*, *Shigella*, *Salmonella*, *Aeromonas*, *Haemophilus*, *Proteus*, *Yersinia*, *Serratia*, y *Vibrio*.

Otros organismos susceptibles son: *Brucella* sp., *Chlamydia trachomatis*, *Staphylococcus* sp. (incluye cepas resistentes a la penicilinas y meticilina) y *Mycobacterium* sp.

COMPOSICIÓN: Cada tableta de ZOO-Floxín® contiene

Ciprofloxacina	100 mg
Excipientes c.s.p.	1 tableta

INDICACIONES: En **perros y gatos** para las infecciones causadas por bacterias sensibles a la ciprofloxacina.

Tratamiento de enfermedades bacterianas sensibles a la ciprofloxacina

Broncopulmonares: Bronquitis, bronconeumonías y neumonías.

Genitourinarias: Pielitis, nefritis, pielonefritis, glomerulonefritis, prostatitis, cervicitis, vaginitis y vulvitis.

Gastrointestinales: Gastroenteritis bacterianas e infecciones secundarias a enfermedades virales.

Cutáneas y subcutáneas: Piodermatitis, erisipela y heridas infectadas.

CONTRAINDICACIONES: No administrar a **perros y gatos** menores de un año que se encuentren en etapa de crecimiento rápido (tener especial cuidado en cachorros de razas gigantes) ya que pueden presentarse artropatías y alteraciones en el cartílago auricular. Las quinolonas están contraindicadas en pacientes hipersensibles al principio activo.

DOSIS: 15 mg/kg de peso vivo, vía oral cada 12 horas equivalente a 1 tableta por cada 10 kg de peso.

Laboratorios ZOO S.A.S.

Autopista Medellín, entrada parque la Florida Km 1, Bodega 10, Terrapuerto Industrial El Dorado.
Cota (Cund) - COLOMBIA. Teléfono 3504604567, (57) 601 8985482 www.laboratorioszoo.com



Tratamiento	Cantidad
Infecciones susceptibles en perros	1/2 a 1-1/2 tableta de ZOO-Floxín® por cada 10 kilos de peso vivo, vía oral cada 12 horas
Infecciones susceptibles en gatos	1/2 tableta de ZOO-Floxín® por cada 5 kilos de peso vivo, vía oral cada 12 horas.

Parámetros de monitorización: Eficacia clínica y efectos adversos.

ADMINISTRACIÓN: Oral.

PRECAUCIONES: Se puede presentar sinergismo en la actividad antibacteriana con los aminogolucósidos, cefalosporinas de tercera generación y penicilinas de amplio espectro (especialmente contra *Pseudomona aeruginosa* y otras enterobacterias).
No se recomienda el uso concomitante con la nitrofurantoina, ya que se antagoniza la actividad antibacteriana.

Las fluoroquinolonas pueden exacerbar la nefrotoxicidad de la ciclosporina (si son usadas sistemáticamente).

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

PRESENTACIÓN: Caja por 20 **tabletas**.

Laboratorios ZOO S.A.S.

Autopista Medellín, entrada parque la Florida Km 1, Bodega 10, Terrapuerto Industrial El Dorado.
Cota (Cund) - COLOMBIA. Teléfono 3504604567, (57) 601 8985482 www.laboratorioszoo.com