



ZOO-Micina®

Suspensión oral
Antidiarreico
Reg. ICA 300-DB



DESCRIPCIÓN

Zoo-Micina® reúne los componentes necesarios para la terapia etiológica y sintomática de la diarrea, eliminando los microorganismos patógenos y los agentes irritantes del tracto gastrointestinal, protegiendo la mucosa y reduciendo los procesos inflamatorios. La neomicina actúa como bactericida contra la mayoría de los gérmenes patógenos intestinales gram-positivos y gram-negativos. No es inactivada por exudados, enzimas, secreciones gastrointestinales, ni productos intermedios de la digestión o del crecimiento bacterial. Debido a su escasa absorción por el tracto intestinal, no ejerce acción sistémica y su actividad se centraliza en el tubo digestivo.

La homatropina metil bromuro presente en ZOO-Micina®, actúa como antiespasmódico y anticolinérgico de acción inmediata, disminuye la hipermotilidad y la hipersecreción intestinal, favoreciendo el control del cólico y la diarrea. El caolín coloidal y la pectina cítrica son compuestos naturales no absorbibles que tapizan el epitelio intestinal, evitando la irritación, erosión y descamación producidas por los agentes tóxicos e infecciosos. Estas sustancias capturan físicamente los productos tóxicos del metabolismo bacteriano, facilitando su eliminación en la materia fecal.

COMPOSICIÓN:

Cada 1 mL contiene:
Neomicina sulfato.....10,5 mg
Homatropina metil bromuro.....0,1 mg
Caolín coloidal.....120 mg
Pectina cítrica.....9 mg
Excipientes c.s.p.....1 mL

INDICACIONES: Tratamiento de las diarreas en **perros, terneros y cerdos** causadas por los siguientes agentes patógenos: *Escherichia coli*, *Aerobacter* sp., *Klebsiella* sp., *Shigella* sp. y *Proteus* sp. En los casos de gastroenteritis, disentería bacilar, colibacilosis, diarreas inespecíficas y diarreas del recién nacido.

Se indica en las fermentaciones intestinales anormales de origen bacterial y como profiláctico en diarreas de origen viral, como las producidas por parvovirus en caninos, con el fin de evitar infecciones bacterianas secundarias y disminuir la diarrea para contrarrestar la deshidratación.

Laboratorios ZOO S.A.S.

Autopista Medellín, entrada parque la Florida Km 1, Bodega 10, Terrapuerto Industrial El Dorado.

Cota (Cund) - COLOMBIA. Teléfono 3504604567, (57) 601 8985482 www.laboratorioszoo.com



DOSIS: 2 mL/kg de peso, vía oral cada 6 horas durante 3 días seguidos como mínimo.

Dosificar según el siguiente cuadro

Peso del animal	6 - 10 kg	21 - 30 kg	41 - 50 kg
Dosis cada 6 horas	10 mL	30 mL	50 mL

La frecuencia de administración se puede aumentar a cada 3 horas, según el criterio del Médico Veterinario.

ADMINISTRACIÓN: Oral.

TIEMPO DE RETIRO: Los **bovinos** tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 30 días después de finalizado el tratamiento. Los porcinos hasta 20 días después. Consulte al Médico Veterinario.

PRESENTACIONES: Frascos por 60 mL y 120 mL.

Laboratorios ZOO S.A.S.

Autopista Medellín, entrada parque la Florida Km 1, Bodega 10, Terrapuerto Industrial El Dorado.

Cota (Cund) - COLOMBIA. Teléfono 3504604567, (57) 601 8985482 www.laboratorioszoo.com